

Descrizione di due nuove specie di Uccelli del Capo York. Per
TOMMASO SALVADORI.

Monarcha canescens, nov sp.

Monarcha M. carinato, Vig. et Horsf. *valde affinis, sed paulo minor, partibus superioribus pectoreque canis, alis, cauda et tibiis nigris, et abdomine rufo saturatiore diversus.*

Fronte, gula et plumis palpebralis nigerrimis; capite supra et lateraliter, dorso toto et pectore canis; abdomine et subcaudalibus rufo-castaneis; his, basin versus, partim nigris; tibiis nigris; alis fusco-nigris; tectricibus alarum minoribus prope angulum alae et majoribus anterioribus nigris, reliquis canis, dorso concoloribus; subalaribus nigro et cano-variis, axillaribus rufis, basin versus canescentibus; cauda fusco-nigra, rectricum limbo apicali cineraceo; rostro margaritaceo; pedibus obscure caerule-scentibus; iride nigra.

Long. tot. 0^m, 165; al. 0^m, 085; caud. 0^m, 074; rostri 0^m, 016; tarsi 0^m, 018.

Hab. Caput York.

Un individuo di questa specie fa parte di una Collezione di Uccelli fatta presso Somerset, nel Capo York, dal Sig. D'Alberty e dal suo compagno di viaggio Sig. Tomasinelli. Della stessa collezione fanno parte cinque individui del *M. carinatus* e da tutti esso differisce 1.° per le dimensioni alquanto minori; 2.° pel colorito cenerino chiaro delle parti superiori e del petto; 3.° pel colore rugginoso delle parti inferiori più intenso, quasi castagno; 4.° per le piume del sottocoda colla base in parte nera; 5.° per le piume delle tibie nere; 6.° per le ali nere e non grigio-plumbee; 7.° per le cuopratrici superiori delle ali, non di color grigio-plumbeo uniforme, ma quelle minori presso l'angolo dell'ala e le maggiori anteriori di color nero, e le altre del color cenerino chiaro del dorso; e 8.° finalmente per la coda nera e non grigio-plumbea.

Ninox peninsularis, nov. sp.

Ninox *N. conniventi* (Lath.) *valde affinis, sed minor, supra obscurior, maculis gastraei obscurioribus, tibiis rufescentioribus.*

Long. tot. 0^m, 430-0^m, 490; al. 0^m, 275-0^m, 260; caud. 0^m, 170-0^m, 160; rostri hiat. 0^m, 031; tarsi 0^m, 047.

Hab. Caput York. •

Il Sig. D'Albertis ed il Sig. Tomasinelli hanno raccolto presso Somerset tre individui di questa nuova specie, la quale differisce dalla *N. connivens* dell'*Australia meridionale* per le dimensioni minori, pel color più oscuro delle parti superiori, e delle macchie longitudinali delle inferiori e pel colore rossigno più vivo delle piume delle tibie e dei tarsi.

Le differenze fra questa specie e la *N. connivens* appaiono evidenti, quando si confrontino individui delle due specie.
